


**PARACID - base**

|   |   |
|---|---|
| <p>תכולה /נפח: מיכל 20 ל'<br/>קרא בעיון את כל ההוראות<br/>לפני השימוש בתכשיר.</p>    | <p>הרכב:<br/>Sodium Chlorite– 3.10%<br/>מים 96.9%<br/>התוויה: Paracid Base תכשיר לחיטוי פטמות לפני<br/>ואחרי חליבה, משולב עם Paracid Active</p> |
| <p>לשימוש וטרינרי בלבד<br/>לא לשימוש ביתי</p>   | <p>ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות<br/>1574 'om</p>  |
| <p><u>אזהרות לאדם:</u> חומר קורוזיבי, גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק חמור לעיניים.</p>  |   |
| <p><u>אמצעי בטיחות ומיגון:</u><br/><b>במהלך הדילול השתמש בציוד מגן הכולל:</b> סרבול עמיד לכימיקלים ונעלי עבודה, כפפות גומי (לפי תקן EN-374/3), יש להשתמש במסכת פנים מלאה (לפי תקן EN-136) עם מסנן משולב (לפי תקן EN14387) מסוג ABEK2P3. להגנה על דרכי הנשימה.</p>   |   |
| <p><u>סיכונים לסביבה:</u> אין לשפוך את התכשיר המרוכז למקורות מים וביוב.</p>   |   |
| <p><u>הוראות שימוש:</u> <b>המוצר מיועד אך ורק לשימוש משולב עם Paracid Active</b><br/>ניתן לערבב את ה- Paracid Base ו- Paracid Active במערכת אוטומטית או באופן ידני.</p>   |   |
| <p><u>לשימוש במערכת אוטומטית.</u><br/>יש להזין את Paracid Active ו- Paracid Base למערכת אוטומטית באמצעות בקר, לקבלת מוצר מוכן לשימוש.</p>   |   |
| <p><u>להכנת תמיסה מוכנה לשימוש באופן ידני:</u><br/>יש להכין את התמיסה באזור מאוורר היטב. כדי להכין תמיסה של 20 ליטר מוכנה לשימוש:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• יש למדוד 452 סמ"ק של התכשיר Paracid Base</li> <li>• לכמות זאת יש להוסיף 113 סמ"ק של Paracid Active ולערבב בעדינות.</li> <li>• יש להמתין במשך 5 דקות לפני הוספת המים.</li> <li>• יש לדלל את התמיסה עם מים באיכות מי שתיה. ל- 20 ליטר (19.435 ל' מים)</li> <li>• <b>לפני חליבה:</b> הברשה/ טבילה / ריסוס של הפטמות, יש להשאיר את התמיסה למשך מספר שניות ולנגב.</li> <li>• <b>לאחר חליבה:</b> היישום / ריסוס / טבילה של הפטמות, (אין צורך בניגוב)</li> <li>• יש להכין את התמיסה אחת לשבוע ולשמור במקום קריר ומוצל.</li> </ul> |   |
| <p><u>טיפול בתכשיר שנישפך:</u> יש לכסות את השפך בנסורת / חול, לאסוף את המוצקים למיכל אשפה לאחר איסוף המוצקים יש לשטוף את האזור המזוהם עם הרבה מים.</p>  |   |
| <p><u>אחסון:</u> יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. אחסן הרחק ממקור חום וממוצרי מזון.</p>   |   |
| <p><u>טיפול באריזות ריקות:</u> בגמר השימוש, יש להחזיר את המיכל הריק ליצרן.</p>  |   |
| <p><u>עזרה ראשונה ומידע לרופא:</u> במקרה של מגע בעור, הסר בגדים ונעלים נגועים אלא אם נדבקו לעור.</p>  |   |

שטוף עם כמויות גדולות של מים במשך 15 דקות לפחות במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי.  
**במקרה של מגע בעיניים:** שטוף במים במשך 15 דקות לפחות (עיניים פקוחות) הסר עדשות מגע במידה וניתן המשך לשטוף והפנה לטיפול רפואי.  
**במקרה של בליעה:** אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, השקה ב-1-2 כוסות מים. הפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.  
**במקרה של שאיפה,** פנה הנפגע מאתר החשיפה לאזור מאוורר אם יש צורך הנשם עם חמצן. פנה לקבלת טיפול רפואי במקרה הצורך.

למידע נוסף: המרכז הארצי למידע רפואי בהרעלות, בייח רמב"ם חיפה, טלפון 04-7771900.  
 במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו ו/או MSDS לרופא.

מספר אצווה

תאריך תפוגה של התכשיר

פרטי היצרן / פרטי היבואן

היצרן: זהר דליה קבוץ דליה 19239 שיווק: זהר דליה פרופשינול קיבוץ דליה 19239

תאריך עדכון התווית 01.2020

**אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המוטבע על גבי האריזה. השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא על פי הוראות התווית עלול לפגוע במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק!!**